

FECHA DE ACTUALIZACION: 31-07-2020 VR 1	PREPARACION PARA PROCEDIMIENTOS	
CODIGO: R-038-PDC		

Preparación:

- ✓ No requiere ayuno o dieta para el procedimiento.
- ✓ Es indispensable presentar el día del procedimiento UROCULTIVO NEGATIVO (Indica que no hay presencia de microorganismos en la orina), a menos que el especialista que le realizara el examen defina otra conducta.
- ✓ Se recomienda 10 días antes de su procedimiento no ingerir medicamentos como Dristan, aspirina, Alkaseltzer, Asawin y medicinas naturales como vitamina E, Ginko Biloba, Ajo, Omega 3, Gingeng, Gengibre.
- ✓ Si usted consume un medicamento en forma regular informe y consulte con el especialista antes de suspenderlos, especialmente si toma medicamentos anticoagulantes, como Warfarina, Heparina, Coumadin, Clopidrogel, Persantin, Liquemine, Ecotrin, Plavix, Clexane, Fraxiparina.
- ✓ En casa antes del examen debe realizarse una adecuada limpieza genital.

El día del procedimiento:

- ✓ Debe presentarse 30 minutos antes del procedimiento, traer documento de identificación, orden médica, y autorizaciones de la entidad correspondiente si es el caso.
- ✓ Si tienen sonda vesical, debe presentarse con una sonda y una bolsa cystoflo para su respectivo cambio

Cuidados posteriores al procedimiento:

- ✓ Es normal que después del procedimiento pueda presentar una pequeña cantidad de sangre en la orina en caso de ser abundante acuda a su médico.
- ✓ Es importante posterior al procedimiento en el transcurso del día ingerir de seis a ocho vasos de agua.
- ✓ En ocasiones los baños de asiento pueden ayudar a mejorar la sensación de deseos de orinar.
- ✓ No debe consumir bebidas alcohólicas hasta 24 horas posteriores al procedimiento.
- ✓ Si presenta síntomas como fiebre, escalofrió, dolor intenso o dificultad para orinar consulte a su médico tratante o al servicio de urgencias de su entidad de salud correspondiente.
- ✓ Recuerde seguir las recomendaciones del especialista que le realiza el procedimiento en cuanto a ingesta de medicamentos como analgésicos y/o antibióticos, si es el caso.